

# PRODUKCJA WOLNA OD BAKTERIOZ ZGODNIE Z ZASADAMI INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN

Decyzją URPL nr 4236/10 środek Huwa San TR50 został dopuszczony do zapewnienia higieny w uprawie i przechowywaniu roślin, preparat posiada właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze.

## **Huwa-San TR 50**® HIGIENA W UPRAWACH I PRZECHOWYWANIU PŁONÓW

Pierwszy w Polsce środek o bardzo szerokim zakresie biobójczego działania. Umożliwia dezynfekcję pomieszczeń, powierzchni, maszyn, narzędzi. Potwierdzone działanie wobec *Alternaria*, *Botrytis*, *Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus*, *Cylindrocladium*, *Fusarium*, *Phytophthora*, *Ralstonia solanacearum*, *Rizoctonia*.

Produkt jest przeznaczony do odkażania powierzchni również mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz środkami żywienia zwierząt.

### Wyjątkowe zalety Huwa San TR 50®

- możliwość szybkiego korzystania z wydezynfekowanego pomieszczenia, narzędzi, sprzętu i opakowań **bez potrzeby ich sputkiwania**.
- środek jest bezpieczny dla środowiska w tym wody, wykorzystanie go do sanitzacji wody dodatkowo wpływa na **eliminowanie glonów, biofilmu i zabezpieczenie systemu nawadniania przed zatykaniem**.
- w stosowaniu **bezpieczny** dla ludzi i zwierząt
- możliwość stosowania środka już od 5 °C

**Zalecane dozowanie w celu odkażenia powierzchni:** stosować roztwory robocze o stężeniu 2% w ilości co najmniej 1 litra na 10 m<sup>2</sup> i minimalny czas kontaktu 5 minut.

## REGULARNE STOSOWANIE HUWA SAN TR50 ZAPOBIEGA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ PATOGENÓW I WPŁYWA NA JAKOŚĆ PŁONÓW



**DESIO Holding Sp. z o.o.**  
tel./fax +48 34 363-16-98  
[www.huwasan.pl](http://www.huwasan.pl)

ul. Ludowa 36, 42-215 Częstochowa  
mob: 695-197-321  
e-mail [handel@huwasan.pl](mailto:handel@huwasan.pl)

# B<sub>o</sub>steran

## PROGRAM STOSOWANIA ŚRODKA W UPRAWIE ZIEMIŃIAKA



ZAPRAWIANIE  
środkiem  
standardowym  
+

**B<sub>o</sub>steran**

w stężeniu  
**0,5%**  
(pełne pokrycie  
powierzchni bulw)

**OPRYSKIWIWANIE**



**FUNGICYD**



**FUNGICYD**



PRZED PIERWSZYM  
FUNGICYDEM

**B<sub>o</sub>steran**

w stężeniu  
**0,1%**

(z wysokim punktem  
rosy, najlepiej  
po opadach deszczu)

**OPRYSKIWIWANIE**

KOLEJNY ZABIEG

**B<sub>o</sub>steran**

w stężeniu  
**0,1%**

(z wysokim punktem  
rosy, najlepiej  
po opadach deszczu)

**OPRYSKIWIWANIE**

KOLEJNY ZABIEG

**B<sub>o</sub>steran**

w stężeniu  
**0,1%**

(w przypadku  
obfitych opadów)

**OPRYSKIWIWANIE**

POZBIORCZO  
w trakcie transportu

bulw do  
pomieszczenia

**B<sub>o</sub>steran**

w stężeniu  
**0,5%**

**ZAMGLAWIANIE**  
**DROBNOKROPLISTE**

ZAMGLAWIANIE

w trakcie  
przechowywania

**B<sub>o</sub>steran**

w stężeniu  
**0,5%**

**ZAMGLAWIANIE**  
**DROBNOKROPLISTE**

Nie stosować łącznie z fungicydem, odstęp czasowy uzależniony od ilości dni karencji danego fungicydu, na ogół 10 - 12 dni.  
Środek Bisteran nie ma karencji. Doradztwo indywidualne dla każdego klienta.